



DOSE  
FINO A  
10 LT  
D'ACQUA

# ESTRATTO DI ORTICA 100 ml

INSETTICIDA, FUNGICIDA, ACARICIDA

## Composizione

Prodotto previsto dall'allegato II del Reg. CE 889/2008 che disciplina le produzioni biologiche. Autorizzazione per l'immissione sul mercato non richiesta ai sensi dell'art. 28 del Reg. CE 1107/2009. Sostanza di base (art. 23 - Reg. (CE) n. 1107/2009; Reg. (UE) n. 419/2017, Rapporto SANCO/11809/2016. "Sostanza di base approvata ai sensi dell'art. 23 del Reg. CE 1107/2009 e del Reg. UE 419/2017" Preparato a base di Estratto acquoso di ortica con azione insetticida, fungicida e acaricida. Il prodotto manifesta un'azione diretta su molte specie di insetti (adi, tignola, carpocapsa), su acari (ragnetto rosso) e di prevenzione di importanti malattie fungine (alternaria, monilia, oidio, peronospora), permettendo l'ottenimento di buone condizioni biologiche, che si traducono in un miglioramento del livello produttivo e delle qualità organolettiche dei frutti limitando il ricorso a specifici fungicidi. Il prodotto si presta alla coltivazione naturale delle piante o alla integrazione delle pratiche colturali che annoverano l'impiego di prodotti di sintesi. Componenti principali : Estratto acquoso di ortica (Urtica dioica e Urtica urens) 10% Cas No 84012 -40 -8 Purezza Farmacopea Europea.

BIO

### Avvertenze:

H315 Provoca irritazione cutanea P264. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso P280. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P321 Trattamento specifico non necessario. P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. P362 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Il produttore non risponde per i danni causati dall'uso improprio del prodotto. Non miscelare con prodotti organici e in particolare con idrolizzati proteici. Prima di effettuare miscele con fitofarmaci o altri concimi, effettuare una prova di compatibilità. **NON EFFETTUARE APPLICAZIONI DURANTE LA FIORITURA.**

## Dosi e modalità d'impiego

### Dose fino a 10 LT di acqua.

Diluire 10 / 15 ml di prodotto in 1 litro di acqua, e spruzzare la soluzione così ottenuta direttamente sull'area fogliare delle colture.

PERIODO DI UTILIZZO : "Applicazione fogliare: eseguire da 1 a 5 trattamenti ogni 7-15 giorni. Da utilizzarsi in accordo con le indicazioni specifiche incluse nel Rapporto di riesame SANTE/11809/2016"

Da marzo a settembre

"La Sostanza di base non ha effetto nocivo, né immediato né ritardato, sulla salute umana o degli animali né effetto inaccettabile sull'ambiente. Non è una sostanza potenzialmente pericolosa e non possiede una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici (Reg. CE N. 1107/2009 - art. 23).

## Confezioni

Confezione COD: 1117  
Flacone 100 ml x 20 pz

